

ПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СВИНЕЙ МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ

С.Л. Войтенко

Україна, Інститут свинарства УААН

Освітлені напрямки удосконалення свиней миргородської породи, перспективи та

нофонд свиней в Україні включає в себе більше 10 порід, типів і ліній різного у продуктивності. Не останнє місце в цьому ряду займає миргородська порода свиней від загального поголів'я свиней в країні). Порода відноситься швидше до м'ясо-, ніж сального напрямку продуктивності, завдяки цілеспрямованому відбору за тулуба, товщиною шпик, віком досягнення живої маси 100 кг та "прилиттю крові" генотипів (п'стрен, гемпшир, уельс, ландрас). При цьому порода стійко утримує високі і якості. Генетичний потенціал породи високий та селекційне плато за більшістю ознак ато нижче від універсальних порід (велика біла та українська степова біла). На жаль, пів'я тварин зосереджене в господарствах і з застарілим обладнанням, низьким рівнем а засобами механізації, що не дозволяє тваринам проявити високу спадковість за тими селекційними ознаками.

танні роки в породі не створюються лінії та родини не через відсутність племінної цього напрямку, а швидше через унікальність комплексу генів, що характеризують аної популяції. Тварини не покращують свої господарсько-корисні ознаки в результаті я крові" генотипів, а за деякими з них спостерігається і погіршення. Подібна тенденція алась при використанні в якості батьківських форм кнурів: великої білої породи кої селекції) – знизилась всі показники відтворювальної здатності на 18,6–50,7 %, орної – підвищилась сальність туш.

оте розведення свиней миргородської породи довгі роки "в собі" хоча і створило онсолідовану популяцію, не варто забувати і про інбридинг та його наслідки. На даний дні племінні господарства в заводських стадах мають 50–70 % інбредних поєднань, що про дію направленного відбору.

ке, з одного боку, в породі ще є можливості уникати деякий час загрози інбридинга, а боку, – пошуки ефективних варіантів не повинні відкладатись на невизначений час. ше, що проблема інбридингу, який має досить давню історію з точки зору біології, селекції та еволюції, має мінливе і досить часто різко протилежне значення.

ослідженнях, що проводились в п/з ім. Декабристів (Полтавська обл.) поєднання аток, що перебували в родинних зв'язках між собою в межах 3–3 по Шапоружу, мали меншу багатоплідність, збереженість та середню масу однієї голови, в порівнянні з и гетерогенного підбору.

ерспективі планується вивчити варіанти схрещування свиноматок миргородської кнурами української степової рябої, білоруської чорно-рябої порід та, по можливості, ами зарубіжної селекції, які схожі за продуктивністю та мастю тварин.